

# 子どもの定期予防接種一覧

ワクチン名	接種開始年月日		回数	法律等による接種年齢	その他
ヒブ	① 生後2カ月～7カ月の前日までに開始した場合		3回(27～56日の間隔) 追加1回(初回接種終了後7～12カ月)	生後2カ月～ 5歳の誕生日の前日まで	・初回接種開始は、生後2カ月～7カ月の間にするのが標準です。 ・予診票は、綴りの中にあります。
	② 生後7カ月に至った日の翌日～1歳の誕生日の前日までに開始した場合		2回(27日～56日の間隔) 追加1回(初回接種終了後7～12カ月)		
	③ 1歳～5歳の誕生日の前日まで		1回		
小児用肺炎球菌	① 生後2カ月～7カ月の前日までに開始した場合		3回(27日以上の間隔) ※1歳の誕生日の前日までに完了 追加1回(1歳以上) ※初回の3回目から60日以上の間隔	生後2カ月～ 5歳の誕生日の前日まで	・初回接種開始は、生後2カ月～生後7カ月まで。 追加接種は、1歳～1歳3カ月に至る日の前日までにするのが標準です。 ・予診票は、綴りの中にあります。
	② 生後7カ月に至った日の翌日～1歳の誕生日の前日までに開始した場合		2回(27日以上の間隔) ※1歳の誕生日の前日までに完了 追加1回(1歳以上) ※初回の2回目から60日以上の間隔		
	③ 1歳～2歳の誕生日の前日までに開始		2回(60日以上の間隔)		
	④ 2歳～5歳の誕生日の前日まで		1回		
B型肝炎	生後2カ月～生後9カ月に至るまで		3回 ※27日以上の間隔で2回、1回目の接種から139日以上を経過した後に1回	1歳の誕生日の前日まで	・予診票は、綴りの中にあります。
四種混合 ジフテリア・ 百日せき・破傷 風・ポリオ	第1期 初回	生後3～12カ月	3回 (20日～56日の間隔)	生後3カ月～90カ月に至るまで (7歳6カ月に至る日の前日まで)	・第2期は二種混合になります。 ・予診票は、綴りの中にあります。
	第1期 追加	3回目(第1期初回) 終了後、1年～1年半	1回		

ワクチン名	接種開始年月日		回数	法律等による接種年齢	その他
二種混合 ジフテリア・破傷風	小学校6年生		1回	11歳以上～13歳未満	予診票は個別に郵送します
BCG	生後5カ月～生後8カ月に達するまで		1回	生後3カ月～1歳の誕生日の前日まで	・予診票は、綴りの中にあります。
麻しん・風しん (MR)	第1期	1歳～2歳未満	1回	標準的な接種年齢と同じ	・予診票は、綴りの中にあります。
	第2期	年長児	1回		
水痘 (水ぼうそう)	1回	1歳～1歳3カ月に至るまで	1回	1歳～3歳の誕生日の前日まで (1回目と2回目の間は、3カ月以上の間隔をおく)	・予診票は、綴りの中にあります。
	2回	1歳～2歳未満1回目終了後	1回		
日本脳炎	第1期初回	3歳	2回(6～26日の間隔)	生後6カ月～7歳半に至るまで	・予診票は、綴りの中にあります。
	第1期追加	4歳	1回(第1期初回終了後おおむね1年後)		
	第2期	9～10歳	1回	9歳以上13歳未満	予診票は個別に郵送します
子宮頸がん	13歳となる日の年度(中学1年生)		3回	・小学校6年生～高校1年生に相当する年齢の女子 ・平成9年度～平成17年度生の女性 ※キャッチアップ接種	予診票や通知案内を個別に郵送します。
ロタウイルス (R2.10.1～より定期接種化)	ロタリックス (1価)	生後6週～生後24週	2回 (初回接種は生後14週6日まで 2回目は4週間以上の間隔をあける)	① ロタリックス(1価) 生後6週～生後24週  ② ロタテック(5価) 生後6週～生後32週	・予診票は、綴りの中にあります。 3回分あるため、ロタリックスを接種した方は、3回目を使用しないでください。
	ロタテック (5価)	生後6週～生後32週	3回 (初回接種は生後14週6日まで 2, 3回目は4週間以上の間隔をあける)		